



## Ce este HPV?

**Patru din cinci persoane** se infectează cu papilomavirusul uman (HPV) la un moment dat în timpul vieții.



## HPV poate ...

**O infecție trece adesea neobservată la început.** Aceasta se poate vindeca de la sine sau, uneori, persistă și declanșează, prin urmare, modificări celulare care pot duce la negi genitali, leziuni precanceroase sau cancer.

... cauza **negi genitali, cancer și leziuni precanceroase** în zona genitală și în zona capului și gâtului.



## Cum vă puteți infecta?

**Papilomavirusurile umane (HPV)** se transmit de la o persoană la alta prin contact direct cu pielea sau mucoasele. Acestea sunt unul dintre cele mai frecvente **virusuri transmise prin contact intim.**


Prezervativele nu pot proteja eficient împotriva unei infecții cu HPV, dar utilizarea lor este recomandată în orice caz.

**Oricine, indiferent de sex,** poate fi infectat cu HPV.

## Ce se întâmplă dacă o infecție cu HPV nu se vindecă de la sine?

Cazuri de cancer cauzate de HPV

Proporția estimată a cazurilor de cancer cauzate de HPV



În fiecare zi, mai mult de **16 persoane** din Austria sunt supuse unei intervenții chirurgicale din cauza unei infecții cu HPV.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum puteți preveni o infecție cu HPV sau aflați mai multe despre acest subiect la [gemeinsam-gegen-hpv.at](http://gemeinsam-gegen-hpv.at)





Cum vă puteți proteja împotriva papilomavirusurilor umane?



Recomandarea vaccinării împotriva HPV în Austria



De ce este esențială vaccinarea timpurie împotriva HPV?


Vaccinarea împotriva HPV este una dintre cele mai importante măsuri preventive. Vaccinarea protejează împotriva unor tipuri specifice de cancer cauzate de acest virus.

În conformitate cu schema de vaccinare, vaccinarea împotriva HPV este recomandată insistent **tuturor fetelor și băieților sau femeilor și bărbaților cu vârsta între 9 și 30 de ani.**

De la împlinirea vârstei de 30 de ani, vaccinarea împotriva HPV este recomandată opțional.

Vaccinarea împotriva HPV este eficientă ca măsură preventivă. În mod ideal, vaccinul ar trebui administrat cât mai devreme posibil, între **9 și 12 ani**, deoarece sistemul imunitar răspunde cel mai bine la tineri.

## Imunizarea are loc în intervalul de vârstă 9–30 de ani în 2 doze



\* Dacă intervalul dintre prima și a doua vaccinare este mai mic de 5 luni, sunt necesare trei doze.

Schema cu 2 doze pentru vaccinarea împotriva HPV este recomandată în schema de vaccinare 2024 și în conformitate cu recomandările oficiale de vaccinare ale Ministerului Federal pentru Afaceri Sociale, Sănătate, Îngrijire și Protecția Consumatorului (BMSGPK) până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări suplimentare.

Intervalul recomandat între vaccinări este favorabil formării anticorpilor și dobândirii imunității pe termen lung. Seria de vaccinări trebuie finalizată în decurs de un an.



\* În programul de vaccinare gratuită în conformitate cu recomandarea schemei austriece de vaccinare și cu recomandările oficiale de vaccinare ale BMSGPK (valabil până în decembrie 2025 pentru toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 30 de ani).

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., THE ICON VIENNA, Wiedner Gürtel 9–13, 1100 Viena.  
© Marcă comercială înregistrată. © Protejată în baza drepturilor de autor pentru Merck Sharp & Dohme Corp., o companie a Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, SUA. Toate drepturile rezervate.

AT-NON-02691, 11/2024

Vaccinați-vă acum gratuit\* dacă aveți între 9 și 30 de ani!